

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLF 15-6-67 660649

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)
(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

ABONNEMENT ANNUEL
25 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.
C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

Supplément n° 1 au BULLETIN n° 81 de JUIN 1967

le 9 juin 1967

V I G N E

AVERTISSEMENTS

Mildiou de la vigne

Les premières taches ont été observées le 8 juin. Elles peuvent être à l'origine d'une invasion rapide si des pluies orageuses se produisent prochainement.

En conséquence, et en raison du développement rapide de la végétation, un nouveau traitement devra être appliqué avant le 14 juin. Dans les vignes où la floraison sera commencée, employer un produit organique pur.

Vers de la grappe

Les papillons ont été peu nombreux. Néanmoins, appliquer un traitement avec un produit curatif dans les vignobles exempts de pyrale qui n'ont encore reçu aucun traitement insecticide.

INFORMATION

Oïdium

Ajouter un produit contre l'oïdium à la bouillie antimildiou sauf dans les parcelles les plus précoces où la floraison serait en cours. Dans ce cas, pratiquer de préférence un poudrage.

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS

Tavelures du pommier et du poirier

Des taches de tavelure sur feuilles provenant de contaminations provoquées par les pluies du 23-24 mai sont apparues dans quelques vergers le 7 juin. Il convient donc d'assurer une protection constante de ces arbres à une période où les températures sont favorables à une infestation rapide en cas de pluie.

Un examen minutieux des arbres du verger est recommandé pour en connaître l'état sanitaire à ce sujet.

Carpocapse des pommes

Les sorties de papillons sont régulières mais peu importantes et les pontes observées sont peu nombreuses. Dans les seules zones bien exposées en Marne et dans l'Aube, un premier traitement est recommandé avant le 15 juin. Dans les autres secteurs, attendre un prochain avis pour intervenir contre le carpocapse.

P. 204

AVERTISSEMENT

Mildiou de la pomme de terre

Le traitement recommandé pour le 6 juin reste valable encore pour quelques jours sauf en cas de pluies importantes.

En effet, il est rappelé qu'une pluviométrie de l'ordre de 20 mm réduit très sensiblement l'efficacité d'un traitement fongicide et rend nécessaire une nouvelle application dans les plus courts délais.

Pour l'ensemble des cultures sensibles à la maladie, compte-tenu de l'accroissement du feuillage, il est nécessaire d'envisager un nouveau traitement généralisé pour le 18 juin.

INFORMATION

Puceron noir de la betterave

Ce parasite se maintient dans de nombreuses cultures mais on note depuis quelques jours l'apparition de larves de coccinelles.

Un traitement avec un produit systémique, peut se révéler nécessaire :

- sur les dernières betteraves semées
- exceptionnellement sur des plantes plus fortes, en situation très favorable ou pour des cultures traitées avec des produits non adéquats n'ayant pas contrôlé tous les pucerons et s'étant révélés dommageables à leurs prédateurs.

Le traitement doit être envisagé dès que, en moyenne, une betterave sur six présente un état nettement dépressif dû aux pucerons.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles.

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytopathologique " Champagne "